

Distribución porcentual por edades\* Peso relativo respecto al total de tumores malignos Tasa‡,§

Año	Defunciones	<25	25-64	65 y +	<25	25-64	65 y +	25-64
1955	253	0.8	76.3	22.9	1.0	5.7	2.9	3.6
1956	393	0.8	78.6	20.6	1.2	8.3	3.7	5.7
1957	524	1.1	75.4	23.5	2.0	9.9	4.9	7.1
1958	570	0.9	77.2	21.9	1.9	10.4	4.7	7.7
1959	626	0.5	74.9	24.6	1.0	10.6	5.6	8.0
1960	640	0.8	80.2	19.1	1.5	11.3	4.4	8.6
1961	728	1.5	77.2	21.2	3.3	12.2	5.3	9.1
1962	816	2.1	75.4	22.3	4.9	13.3	5.9	9.8
1963	902	0.8	78.4	20.8	1.7	14.3	5.8	11.0
1964	1 057	0.6	77.9	21.6	1.4	15.8	6.9	12.5
1965	1 058	0.4	74.8	24.9	0.8	15.4	7.5	11.8
1966	1 040	0.4	77.3	22.3	0.9	15.3	6.4	11.7
1967	1 154	0.6	73.9	25.5	1.5	16.8	8.1	12.2
1968	1 208	0.8	75.6	23.6	2.0	17.7	7.6	12.7
1969	1 201	1.0	73.8	25.1	2.1	16.3	7.6	12.0
1970	1 478	0.3	75.2	24.5	0.8	19.3	8.5	14.5
1971	1 483	1.0	72.8	26.2	2.2	18.7	8.9	13.7
1972	1 608	1.2	70.6	28.2	2.7	19.4	10.0	14.0
1973	1 784	1.1	71.6	27.3	2.7	20.9	10.5	15.4
1974	1 803	0.7	70.9	28.4	1.8	20.4	10.0	14.9
1975	1 911	0.6	71.1	27.6	1.6	21.8	9.9	15.4
1976	2 107	0.5	69.7	29.0	1.5	22.8	11.1	16.2
1977	2 124	0.6	68.0	31.1	1.5	21.4	11.2	15.4
1978	2 218	0.6	68.4	30.6	1.6	22.3	11.6	15.7
1979	2 405	0.9	67.5	30.9	2.4	23.0	11.7	16.2
1980	2 543	0.8	66.9	31.7	2.2	23.9	12.5	16.4
1981	2 626	0.6	67.0	31.8	1.8	23.0	12.3	16.3
1982	2 960	0.8	66.4	32.0	2.4	25.0	13.1	17.6
1983	3 057	0.6	66.0	32.7	2.0	24.5	13.6	17.4
1984	3 304	0.7	65.9	32.9	2.4	25.4	14.1	18.1
1985	3 572	0.4	64.4	34.4	1.3	25.0	14.2	18.5
1986	3 621	0.7	65.3	33.4	2.5	25.1	13.6	18.3
1987	3 900	0.6	64.8	34.2	2.2	25.4	14.6	18.8
1988	4 096	0.7	64.7	34.3	2.4	25.9	14.8	19.1
1989	4 290	0.8	64.9	33.8	2.9	26.4	15.0	19.2
1990	4 280	0.7	64.8	34.1	2.7	26.5	14.7	18.3
1991	4 194	0.5	63.9	35.3	1.9	25.1	14.3	17.0
1992	4 346	0.4	63.9	35.5	1.4	24.6	14.4	16.9
1993	4 369	0.7	63.1	36.0	2.5	24.1	14.1	16.2
1994	4 365	0.4	65.0	34.3	1.7	24.2	13.2	16.1
1995	4 392	0.5	63.1	36.1	1.9	22.9	13.4	15.2
1996	4 526	0.4	64.3	35.1	1.5	23.2	12.8	15.4
1997	4 534	0.3	62.2	37.3	1.2	22.0	13.3	14.4
1998	4 545	0.3	63.7	35.9	0.9	21.9	12.6	14.3
1999	4 590	0.3	64.2	35.3	1.1	21.7	12.3	14.1
2000	4 620	0.3	63.1	36.5	1.1	21.5	12.3	13.6
2001	4 512	0.4	62.7	36.7	1.4	20.6	11.7	12.8
2002	4 330	0.5	62.3	37.0	1.7	18.8	11.1	11.9

Nota: Cáncer cérvicouterino: CIE-6, CIE-7, CIE-8, CIE-9 - 180; CIE-10 - C53

\* La diferencia respecto a100% representa el peso relativo de los registros para los cuales no se especifica la edad.

‡ A partir de 1979 el cálculo de la tasa excluye a las defunciones de mexicanas que residían en el exterior, así como a las de extranjeras que fallecieron en el país.

§ Tasa por 100 000 mujeres de 25 a 64 años de edad estimadas por el Consejo Nacional de Población.

Fuente: Base de datos de defunciones 1955-1978. Organización Mundial de la Salud, 2002.

Base de datos de defunciones 1979-2002. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática/Secretaría de Salud, México