


# Araña Violinista

## ¿Donde se encuentran?

**Tienen hábitos nocturnos, huyen de la luz directa, se refugian principalmente:**

- Bajo piedras, corteza de árboles, huecos de la tierra, rocas o paredes
- En techos de vigas viejas o de palma.
- En la maleza
- Cualquier rincón oscuro que los proteja y de acceso fácil a su comida
- En la ropa o toallas



Llega a medir de 1 a 4 cm

## ¿Cuáles son los síntomas por mordedura de araña?

**El Veneno ataca el sistema cutáneo y sistémico.**

- **Locales:** mancha violácea (6-12hrs)
- Formación de ampollas con pus o hemorragias (24-78hrs)
- Formación de costra o úlcera necrosada (3 o 6 semanas)
- **Sistémico:** Todas las manifestaciones locales
- Rompimiento de vasos sanguíneos, anemia, ictericia (piel amarillenta) (6-12 hrs)
- Fiebre alta, calosfríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos (24 hrs)
- Falla renal (por la destrucción masiva de células)

## ¿Qué hacer después de haber sido mordido?

Debe acudir inmediatamente al hospital, donde se le administrará el anti arácnido, porque si no hay una atención inmediata puede ocasionar la muerte.

**EMERGENCIAS | CRUM 01 800 849 42 77**



### **Descarta SSM alerta por araña violinista**

**Cuernavaca, Mor. A 22 de abril de 2016.-** Aunque el índice de casos de mordedura de la araña violinista en Morelos es muy bajo, pues en 2015 sólo se registró un caso. Servicios de Salud de Morelos (SSM) exhorta a la población a extremar precauciones para evitar su mordedura.

El encargado de despacho del departamento de Epidemiología de Servicios de Salud Morelos (SSM), César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido *Loxosceles laeta*, mejor conocido como araña violinista mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros y aislados del contacto humano, por lo que solicitó a los morelenses realizar constantemente limpieza en lugares de la casa como closets, bodegas y jardines, así como detrás de cuadros y muebles.

“La araña es de hábitos nocturnos, huye de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman y necrosan la piel, el tejido celular subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de ampollas con pus, fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, principalmente” informó.

Eroza Osorio puntualizó que en caso de mordedura, es importante evitar auto medicarse y acudir de manera inmediata al hospital más cercano.

“En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la mordedura, en caso de emergencia, invito a la población para que se comunique al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica”.

Finalmente, comentó que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente.

“No hay motivo para alarmarnos, no obstante, si nos corresponde tomar medidas como sacudir la ropa y zapatos antes de vestirnos, revisar la ropa de cama antes de irse a dormir, no andar descalzos, así como mantener limpio el interior y exterior de la vivienda” finalizó.

## **EL REGIONAL DEL SUR**

### **DESCARTA SSM ALERTA POR ARAÑA VIOLINISTA**

Por Redacción.

Pese a que en 2015 sólo hubo un caso de mordedura, se invita a la población a tomar medidas preventivas. Aunque el índice de casos de mordedura de la araña violinista en Morelos es muy bajo, pues en 2015 sólo se registró un caso, los Servicios de Salud de Morelos (SSM) exhortan a la población a extremar precauciones. El encargado de despacho del departamento de Epidemiología de los SSM, César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido *Loxosceles laeta*, mejor conocido como araña violinista mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros y aislados del contacto humano, por lo que invitó a los morelenses realizar constantemente limpieza en lugares de la casa como clósets, bodegas y jardines. "La araña es de hábitos nocturnos, huye de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman y necrosan la piel, el tejido celular subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de ampollas con pus, fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, principalmente", detalló. Eroza Osorio puntualizó que en caso de mordedura, es importante evitar auto medicarse y acudir al hospital más cercano. "En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la mordedura; en caso de emergencia, invito a la población para que se comunique al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica". Finalmente, describió que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente. "No hay motivo para alarmarnos, no obstante, si nos corresponde tomar medidas como sacudir la ropa y zapatos antes de vestirnos, antes de irse a dormir, no andar descalzos, así como mantener limpio el interior y exterior de la vivienda", finalizó.

## **EL SOL DE CUERNAVACA**

### **SIN ALERTA POR ARAÑA VIOLINISTA**

De La Redacción

Aunque el índice de casos de mordedura de la araña violinista en Morelos es muy bajo, pues en 2015 sólo se registró un caso, los Servicios de Salud de Morelos (SSM) exhortan a la población a extremar precauciones. El encargado de despacho del departamento de Epidemiología de los SSM, César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido *Loxosceles laeta*, mejor conocido como "araña violinista" mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros y aislados del contacto humano, por lo que invitó a los morelenses realizar constantemente limpieza en lugares de la casa como clósets, bodegas y jardines. "La araña es de hábitos nocturnos, huye de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman y necrosan la piel, el tejido celular subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de ampollas con pus, fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, principalmente", detalló. Eroza Osorio puntualizó que en caso de mordedura, es importante evitar automedicarse y acudir al hospital más cercano. "En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la mordedura; en caso de emergencia, invitó a la población para que se comunique al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica". Finalmente, describió que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente. "No hay motivo para alarmarnos, no obstante, sí nos corresponde tomar medidas como sacudir la ropa y zapatos antes de vestirnos, antes de irse a dormir, no andar descalzos, así como mantener limpio el interior y exterior de la vivienda", finalizó.